



Registrul agricol
28.05.2020
586

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e-mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 46 din 27.05.2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunatorului/bolii :
MYCOSPHAERELLA FR.(PATAREA ROSIE A FRUNZELOR); BOTRYTIS C. (PUTREGAIUL CENUSIU).
care poate cauza pierderi importante la cultura: **CAPSUN**
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **MYCOSPHAERELLA FR.**(patarea rosie a frunzelor), se manifesta prin apariția pe frunze a unor pete circulare, de 1-3mm în diametru, de culoare rosie – violacee; mai târziu, centrul petelor se necrozează și devine cenușiu albicios. În condiții de umiditate, pe suprafața petelor foliare apare un puf albicios.

BOTRYTIS C. (putregaiul cenușiu), pot fi atacate toate organele supraterane ale plantei, însă boala se manifesta frecvent, cu efectul cel mai pagubitor, pe flori și fructe. Tesuturile atacate se brunifică și, în condiții de umiditate mare, pe suprafața lor apare sporulatia cenușie. Fructele atacate putrezesc în întregime.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, nr. 1 numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: În parcelele unde s-a depășit P.E.D-ul -15% plante atacate.
Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. **SCORE250 EC - 0,03% sau**
2. **TOPAS 100 EC -0,05 % sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va complexa cu insecticid pentru combaterea daunatorilor:

COENORRHINUS GERMANICUS HE. (Gargarita albastră a capsunului); **TETRANYCHUS URTICAE** (Paianjenul roșu)

COENORRHINUS GERMANICUS HE. (Gargarita albastră a capsunului), daunatorul are o singură generație pe an. Zborul adulților are loc începând din a II-a decada a lunii martie până la începutul lunii iunie, adulții atacă frunzele rozând mici orificii. Pontecele sunt depuse în a II-a și a III-a decada a lunii aprilie și sunt depuse în petiolurile frunzelor și în pedunculii florali. În perioada depunerii pontei, adulții taie petiolii frunzelor și florilor. Apariția larvelor în petioli, are loc în a II-a decada a lunii mai, începutul lunii iunie, iar ultimele larve apar în a II-a și a III-a decada a lunii iulie. Larvele se hrănesc cu tesuturile moarte ale plantelor.

1. MAVRIK 2 F(EVURE –a doua denumire comerciala) -0,05 % sau
2. NISSORUN 10 WP - 0,1% sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: LA PRIMIREA AVERTIZARII.

Alte recomandări:

Pentru aderarea solutiei pe planta, in solutia de stropit se adauga adeziv(SILWET GOLD -0,1% sau ARACET -0,2%);

Tratamentul se aplica in zile fara vânt si se va repeta in funcție de remanenta produsului folosit si de condițiile meteo;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vo inscripiona cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor"(denumire produsului folosit.)

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit consilier, Maria BOGDAN

- Conform prevederilor legale prevazute in:Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor,fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect- ării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul apliării feofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe- rii recol- tării pro- dusului agricol	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunăto ri/buruieni	Denu- mire ppp folosi	Doza omolo- gată/doz afolosită	Supra- fața ha	Canti- tăți utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.