



Registru
agricol
14.08.2020
Jh

ONAS DRAGODIRU
REGISTRAT
N. 34454
13 08 2020



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 78 din 13. 08. 2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:

TRATAMENT SAMANTA DE RAPITA

care poate cauza pierderi importante la cultura: **RAPITA**

Pentru prevenirea atacului produs de: **Phyllotreta spp.** (Puricele vargat); **Psylliodes c.** (Purici de pamant): **ATHALIA R.** (Viespea rapitei).

Pentru efectuarea tratamentului, folositi produsul de mai jos, dupa caz:

1. **LUMPIOSA 625 FS - 1.14 L / 100 kg. samanta sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Alte recomandări;

- Statiile /masinile de tratare a semintelor trebuie sa fie dotate cu dispozitive de inmagazinare a prafului care rezulta in urma acoperirii semintelor cu produse de protectie a plantelor;
- Conform HG 135/2019, subsectiunea nr. 11 - privind reducerea impactului asupra insectelor polenizatoare in special albinele, este obligatorie utilizarea deflectoarelor pe semanatoriile pneumatice cu vaucuum utilizate la semanatul culturilor agricole a caror samanta este tratata cu produse de protectie a plantelor.

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre *Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vor inscripiona cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor"(denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !!

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**Intocmit,
Consilier Jeni Nela DAMIAN**

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.79 din 13.08. 2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii:

MAMESTRA C BRASSICAE (Buha verzei) – GEN. a II –a;

BREVICORYNE BRASSICAE (Paduchele cenușiu).

care poate cauza pierderi importanta la cultura: **VARZA, CONOPIDA, GULIOARE**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **MAMESTRA B. (Buha verzei)**, daunator cu doua generatii pe an. Adultii nocturni, a u aripile anterioare de culoare brun – cenușiu cu o macula alba. Larva are abdomen verde la brun- cenușiu, tegument prevazut dorsal cu o dunga longitudinala mai deschisa la culoare. Ataca varza si conopida. Daunatorul in stadiul de larva, afecteaza aparatul foliar pe care produce numeroase perforatiuni cu contur neregulat, iar dupa formarea capatanii patrund in interiorul acestora, unde lasa numeroase defectii.

BREVICORYNE B. (Paduchele cenușiu), formeaza colonii aglomerate pe frunze, tulpini. inflorescente si silicule, de unde prin intepare extrage seva din tesuturi. Frunzele se ingalbenesc si se gofreaza, plantele se opresc din crestere si se usuca.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului nr.1 , numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE – 2-3 larve /planta. Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz

1. KARATE ZEON – 0,015 % sau

2. MOSPILAN 20 SP (GAZELLE –a doua denumire comerciala) - 0,025% sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: LA PRIMELE ECLOZARI SI APARITIA PE PLANTA A LARVELOR SI A COLONIILOR DE PADUCHI.

Alte recomandări;

Tratamentul se aplica in zile fara vant si se va repeta la interval de 10-12 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile meteo.

In solutia de stropit se va adauga SILWET GOLD -0,1% sau Aracet agricol 0,15- 0,2 %.

Se va respecta perioada de pauza pana la recoltare, in functie de remanenta produsului folosit.

Tratamentul se aplica in zile fara vânt si se va repeta în funcție de remanenta produsului folosit si de condițiile meteo;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligatia de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului;

15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10),neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vo inscripiona cu tablite de avertizare “Sola tratata cu produse de protectie a plantelor“(denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

**Intocmit ,
Consilier Jeni Nela DAMIAN**

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.80 din 13. 08. 2020

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii:
BOTRYTIS CINEREA (Putregaiul cenușiu)
care poate cauza pierderi importante la cultura: **VITA DE VIE**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **BOTRYTIS C. (Putregaiul cenușiu)**, atacul se manifestă pe frunze, lastarii tineri și fructe. Pe frunze apar pete, inițial galbui, care apoi devin roșiatice. În dreptul petelor foliare, se dezvoltă mai târziu un mucegai cenușiu format din sporulăția ciupercii. Pe lastari, infecția începe de la noduri, unde tesuturile afectate sunt acoperite de mucegaiul cenușiu caracteristic. Atacul cel mai pagubitor este pe fructele mature. Acestea au la început culoare galbenă – cenușie sau violacee. Bacele atacate se înmoaie, crapă și sunt acoperite de un mucegai cenușiu caracteristic. Aceste fructe putrezesc și se desprind ușor de pe peduncul.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. **CABRIO TOP - 0,15 - 0,2 % sau**

2. **TELDOR 500 SC - 0,1 % sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va combina cu insecticide și/ sau acaricide, pentru combaterea daunătorilor:

- **LOBESIA BOTRANA (Molia strugurilor) GEN. a III- a (tratamentul nr. 2);**
- **TETRANYCHUS SP. (Paianjanul comun);**

Folosiți unul din produsele:

1. **SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD –a doua denumire comercială) -0,02 % sa**
2. **KARATE ZEON - 0,015 % (NINJA –a doua denumire comercială) sau**
3. **ENVIDOR 240 SC -0,04 % sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE.

Perioada optimă de tratament: **Intrarea în pargă – se încheie cu 3– 4 săptămâni înainte de recoltare.**

Alte recomandări;

Tratamentul se va efectua în perioada avertizată în zile fără vânt și se va repeta la 10-12 zile în funcție de remanenta produsului folosit și de condițiile meteo.

În soluția de stropit se va adăuga **SILWET GOLD -0,1% sau Aracet agricol 0,15-0,2%.**

Se va respecta perioada de pauză până la recoltare, în funcție de remanenta produsului folosit.

Tratamentul se aplică în zile fără vânt și se va repeta în funcție de remanenta produsului folosit și de condițiile meteo;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în **PEST EXPERT** pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungea cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de climă și mediu privind Ecocondiționalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratată cu produse de protecție a plantelor" (denumirea produsului folosit).

IMPORTANT !

**BULETINELE DE PROGNOZA ȘI AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Intocmit,

Consilier Jeni Nela DAMIAN

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 81 din 13.08.2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunatorului/bolii:

COMPLEX DAUNATORI (PHYTODECTA F., SUBCOCCINELA 24 PUNCTATA, SITONA L.)

care poate cauza pierderi importanta la cultura: **LUCERNA**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **PHYTODECTA F.(gandacul rosu al lucernei),adultii si larvele ataca frunzele si lastarii plantei. Larvele rod frunzele de la margini spre nervura principala, pe masura ce ele se dezvoltă,distrug aproape total frunzele lasand decat nervurile principale.In caz de aparitii in masa sunt atacati si lastarii,astfel incat plantele se usuca rezultand daune insemnate. In urma atacului produs de larve in luna mai la prima coasa a lucernei,cand lucernierele se cosesc timpuriu, larvele mature ataca si la a doua coasa.**

SUBCOCCINELLA 24 PUNCTATA(buburuza lucernei), insecta prezinta doua generatii pe an.Prima generatie se dezvoltă in lunile mai- iunie, iar a doua in lunile iulie –august.Insecta ataca in stadiul de adult si larva distrugand epiderma si tesutul frunzei, de unde extrag suc. Frunzele raman sub forma unor creste paralele si albicioase.In urma atacului ,frunzele se rasucesc si se usuca.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului , numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE >30 % plante atacate. Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz

FASTAC 10 EC - 0,15 l/ha. sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: **DUPA a III-a COASA**

Alte recomandări;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate; Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii,producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10),neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor"(denumirea produsului folosit).

Intocmit , Consilier Jeni Nela DAMIAN

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 82 din 13.08.2020

Pentru protejarea culturilor de cereale paioase de toamna împotriva unor agenți de daunare care se transmit prin samanta și sol: **ZABRUS T.**(Gandacul ghebos); **AGRIOTES SPP.**(Viermii sarma); **TILLETIA SPP.** (Malura comuna); **FUSARIUM SPP.**(Fuzarioza); **PYRENOPHORA GR.**(Sfasierea frunzelor).

Recomandam efectuarea tratamentului fitosanitar la:

SAMANTA DE GRAU SI SAMANTA DE ORZ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul produsele de mai jos, după caz:

1. AUSTRAL PLUS - 5,0 l/ t. samanta sau

2. SPONSOR 6 FS - 0,5 l/t. samanta sau

3. TENAZOL 60FS -0,5 l/t samanta sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

ATENȚIE!!

- Statiile /masinile de tratare a semintelor trebuie sa fie dotate cu dispozitive de inmagazinare a prafului care rezulta in urma acoperirii semintelor cu produse de protectie a plantelor;
- Conform HG 135/2019, subsecțiunea nr. 11 - privind reducerea impactului asupra insectelor polenizatoare in special albinele, este obligatorie utilizarea defletoarelor pe semanatoriile pneumatice cu vaucuum utilizate la semanatul culturilor agricole a caror samanta este tratata cu produse de protectie a plantelor.

Alte recomandări;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima și mediu privind Ecocondiționalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratată cu produse de protecție a plantelor"(denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !!

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit, Consilier Jeni Nela DAMIAN

Conform prevederilor legale prevazute in:Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor,fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ Fenofaza culturi	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea condițiilor de depozitare,manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.