

Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 58 din 14.06. 2023

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **MAMESTRA BRASSICAE (Buha verzei) – Generatia I-a; BREVICORYNE BRASSICAE (Paduchele cenusiu); PIERIS BRASSICAE (Fluturele alb al verzei); DELIA BRASSICAE (Musca verzei).**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: VARZA, CONOPIDA



Scurta descriere a daunatorului:

MAMESTRA B. (Buha verzei), daunator cu doua generatii pe an. Adultii nocturni, a u aripile anterioare de culoare brun – cenusiu cu o macula alba. Larva are abdomen verde la brun- cenusiu, tegument prevazut dorsal cu o dunga longitudinala mai deschisa la culoare. Ataca varza si conopida. Daunatorul in stadiul de larva, afecteaza aparatul foliar pe care produce numeroase perforatiuni cu contur neregulat, iar dupa formarea capatanii patrund in interiorul acestora, unde lasa numeroase dejectii.



BREVICORYNE BRASSICAE (Paduchele cenusiu), formeaza colonii aglomerate pe frunze, tulpini, inflorescente si silicule, de unde prin intepare extrage seva din tesuturi. Frunzele se ingalbenesc si se gofreaza, plantele se opresc din crestere si se usuca.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE - 2-3 larve / planta.**

1. **MAVRIK 2F - 0,05% sau**
2. **AFFIRM – 1,5 kg/ha sau**
3. **MOSPILAN 20 SP /GAZELLE - 0,250 kg./ha sau**
4. **KARATE ZEON / NINJA -- 0,075 l/ha sau**
5. **MOVENTO 100 SC – 0,75 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA PRIMELE ECLOZARII SI APARITIA PE PLANTE A LARVELOR SI COLONIILOR DE PADUCHI.**

Alte recomandări:

Intotdeauna cititi si utilizati produsele de protectie a plantelor – conform recomandarilor de pe eticheta, respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare!

Tratamentul se aplica in zile fara vant, si se va repeta la interval de 10-12 zile in functie de remanenta produsului folosit si conditiile meteo.

In solutia de stropit se va adauga Aracet agricol 0,15 -0,2%.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN