

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 47 din 06.06.2023

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **ERWINIA AMYLOVORA (FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR); APHIS POMI (PADUCHELE VERDE AL MARULUI)**
Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: MAR, PAR, GUTUI



Scurtă descriere a bolii: **ERWINIA**

AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor), atacul se manifesta pe organele supraterrane ale plantei. Pe frunze, atacul se manifesta sub forma unor pete brune, care se extind si ocupa intregul limb foliar. Lastarii atacati au frunze moarte si persistente. Fructele bolnave se inegresc la par si se brunifica la mar.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **Nr. II - POSTFLORAL**:
Pentru efectuarea tratamentului, **POSTFLORAL** folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos:

1. **ALCUPRAL 50 PU - 0,04% (0,6 kg./ha) sau**
2. **CHAMP 77 WG - 0, 2% sau**
3. **CUPROXAT FLOWABLE / KUPFEROL - 0, 35 % sau**
4. **VITRA 50 WP / CUPRIDIN - 1,5 – 2,0 kg./ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

APHIS POMI (paduchele verde al marului), care pot fi vectorii de raspandire a bacteriei.



Scurta descriere a daunatorului:

APHIS POMI (paduchele verde al marului), larvele migreaza pe fata inferioara a frunzelor si la varful lastarilor noi. Dupa o perioada

scurta de hranire ele devin femele aptere si aripate, care se inmultesc in cateva generatii. Insectele adulte formeaza colonii compacte pe dosul frunzelor si pe varful lastarilor. Inteapa frunzele si se hranesc cu sucular celular. In urma intepaturilor, frunzele se rasucesc, se ingalbenesc si cad prematur. Pe dejectiile eliminate din abundenta pe frunze („roua de miere”) se instaleaza fumagina, care impiedica asimilarea normala a frunzelor.

1. MAVRIK 2 F / EVURE – 0,05 % (0,75 l/ha.) sau

2. KARATE ZEON /NINJA - 0,015% (0,225 l/ha). sau

3. DELTAGRI / FASTER DELTA – 0,375 -0,45 l/ha. sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Se recomanda taierea ramurilor afectate de bacteria ERWINIA AMYLOVORA ,cu 30 cm sub punctul de infectie!

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN