



Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 58 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **MAMESTRA BRASSICAE** (Buha verzei) – **Generatia I-a**; **BREVICORYNE BRASSICAE** (Paduchele cenusiu); **PIERIS BRASSICAE** (Fluturele alb al verzei); **DELIA BRASSICAE** (Musca verzei).

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **VARZA, CONOPIDA**



MAMESTRA B. (Buha verzei), daunator cu doua generatii pe an. Adultii nocturni, a u aripile anterioare de culoare brun – cenusiu cu o macula alba. Larva are abdomen verde la brun- cenusiu, tegument prevazut dorsal cu o dunga longitudinala mai deschisa la culoare. Ataca varza si conopida. Daunatorul in stadiul de larva, afecteaza aparatul foliar pe care produce numeroase perforatiuni cu contur neregulat, iar dupa formarea capatanii patrund in interiorul acestora, unde lasa numeroase dejectii.



BREVICORYNE BRASSICAE (Paduchele cenusiu), formeaza colonii aglomerate pe frunze, tulpini. inflorescente si silicule, de unde prin intepare extrage seva din tesuturi. Frunzele se ingalbenesc si se gofreaza, plantele se opresc din crestere si se usuca.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 1** , numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE - 2-3 larve / planta.**

1. **MAVRIK 2F - 0,05% sau**
2. **AFFIRM – 1,5 kg/ha sau**
3. **MOSPILAN 20 SP /GAZELLE - 0,250 kg./ha sau**
4. **KARATE ZEON / NINJA -- 0,075 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament:**LA PRIMELE ECLOZARII SI APARITIA PE PLANTE A LARVELOR SI COLONIILOR DE PADUCHI.**

Alte recomandări:

Intotdeauna cititi si utilizati produsele de protectie a plantelor – conform recomandarilor de pe eticheta, respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare!

Tratamentul se aplica in zile fara vant, si se va repeta la interval de 10-12 zile in functie de remanenta produsului folosit si conditiile meteo.

In solutia de stropit se va adauga Aracet agricol 0,15 -0,2%.

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.59 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **COMPLEX DAUNATORI** (PHYTODECTA F., SUBCOCCINELLA 24 PUNCTATA, SITONA L., LACUSTE, COSASI).

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **LUCERNA**



PHYTODECTA F.(gandacul rosu al lucernei),adultii si larvele ataca frunzele si lastarii plantei. Larvele rod frunzele de la margini spre nervura principala, pe masura ce ele se dezvoltă,distrug aproape total frunzele lasand decat nervurile principale.In caz de aparitii in masa sunt atacati si lastarii,astfel incat plantele se usuca rezultand daune insemnate. In urma atacului produs de larve in luna mai la prima coasa a lucernei,cand lucernierele se cosesc timpuriu, larvele mature ataca si la a doua coasa.



SUBCOCCINELLA 24 PUNCTATA (buburuza lucernei), insecta prezinta doua generatii pe an.Prima generatie se dezvoltă in lunile mai- iunie, iar a doua in lunile iulie –august.Insecta ataca in stadiul de adult si larva distrugand epiderma si tesutul frunzei, de unde extrag suc. Frunzele raman sub forma unor creste paralele si albicioase.In urma atacului ,frunzele se rasucesc si se usuca.

Pentru prevenire si combatere se recomandă executarea tratamentului , numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE >30 % plante atacate.

Recomandam folosirea produsului de protectie a plantelor recomandat:

1. DELTAGRI / FASTER DELTA – 0,3 l/ha. sau
alte produse pentru protectia plantelor omologate,peptu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.
Perioada optimă de tratament: **DUPA a II-a COASA.**

Alte recomandari:

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 60 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **PLASMOPARA VITICOLA** (*Mana*); **UNCINULA N.** (*Fainarea*).

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **VITA DE VIE**



Plasmopara v. (mana), boala se manifestă pe toate organele supratereștrii ale plantei. Atacul pe frunze este cel mai frecvent, pe fața superioară a frunzelor, apar pete galbene. Acestea au aspectul de pete undelemnii, petele undelemnii confluează și ocupă porțiuni mari pe limbul frunzei. Treptat, petele foliare se măresc, capătă culoarea roșiatică, iar în dreptul tesuturilor se necrozează, se brunifică și se usușă. În timpul înfloritului în anii ploioși, atacul este foarte periculos pe ciorchinii tineri, deoarece aceștia se usușă și cad. Boala se poate manifesta și pe boabe în toate stadiile de dezvoltare. Atacul se poate manifesta prin putregaiul cenușiu și putregai brun. Fructele infectate sunt acoperite cu puf alb – cenușiu. Putregaiul brun apare pe boabele mai mari, infecția se realizează prin reduncul și receptacul. Boabele atacate devin brune, se zbarcesc și cad.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 3**:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz cu:

1. **MAGMA TRIPLE WG/ ALLEATO TRIPLE** - 0,2 - 0,3 % sau
2. **CHAMP 77 WG / COPPERMAX** – 0,2% sau
3. **CURENOX 50** – 0,15 - 0,2 % sau
4. **CAPTAN 80 WDG / CAPTADIN** – 1,250 kg./ha sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu insecticide pentru combaterea daunătorilor:

LOBESIA BOTRANA (Molia vitei de vie);

ERIOPHYES SP. (ACARIENI EROFIZI)

TETRANYCHUS SP. (Paianjanul roșu comun)



LOBESIA BOTRANA. (Molia vitei de vie). Molia vitei de vie are 2 – 3 generații pe an. Fluturile au aripile de 1,8 – 2 cm, corpul de

0,8 cm lungime. Aripile posterioare sunt cenușii cu franjuri, iar cele anterioare prezintă pete de culoare bruna alternând cu zonele deschise de culoare cenușie – albastruie. Larva are corpul colorat brun – verzui, verde- deschis, lungimea corpului este de 1,2 cm. În lunile iunie – iulie femela generației a II – a își depune pontele pe boabele verzi sau în parga ale strugurilor. Semnele atacului sunt evidente prin prezenta larvelor pe ciorchine, sub scoarta butucilor, coardelor mai batrane ce se exfoliază. În luna iunie apar larvele generației a I – a care se hrănesc cu bobocii floriferi și boabe tinere. Atacul generațiilor a II – a (luna iunie) și a III – a (luna august) atunci găuresc boabele și consumă pulpa dând posibilitatea instalării cu ușurință a putregaiului (**BOTRYTIS CINEREA**).



ERIOPHYES SP. (ACARIENI EROFIZI), prezintă 5 -7 generații pe an. Iernează în stadiul de adult sub solzii exteriori ai mugurilor, în crapăturile scoartei butucilor. În primăvară, acarienii își fac apariția la începutul lunii mai, în fază când încep să se formeze primele frunzulite, localizându-se pe partea inferioară a limbului, unde se hrănesc întepând țesuturile și sugând suc celular. La locul hrănirii apare o pasă de peri epidermici, la adăpostul căreia acarienii se hrănesc și se înmulțesc. Când țesuturile din zonele daunate se necrozează, acarienii migrează pe alte frunze neatacate. În cazul unui atac puternic sunt atacați și ciorchinii, când aceștia se află în fază de înflorire, producând avortarea florilor.



TETRANYCHUS SP. (Paianjanul roșu comun), ataca aparatul foliar, pe partea inferioară a frunzelor. Pe frunze se recunoaște cu ușurință după prezenta unei păse matasoase maronii, iar pe partea superioară a frunzelor după depigmentarea, albirea și uscarea dintre nervuri. Atât adulții cât și larvele se hrănesc cu seva plantelor, pe care o absorb din țesuturi prin întepare.

1. DELTAGRI / FASTER DELTA - 0,2 - 0,3 l/ha sau
2. VERTIMEC 1,8% EC - 0,075 - 0,1% sau
3. NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau
4. LASER 250 SC / NEXUBA – 0,15- 0,2 l/ha sau
5. DECIS EXPERT100 EC -75 ml/ha sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioadă optimă de tratament: **LA COMPACTAREA CIORCHINILOR**

Alte recomandări:

Tratamentul se va efectua în perioada avertizată în zile fără vânt, și se va repeta la 10- 14 zile în funcție de remanenta produsului folosit și condițiile meteo.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind

implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.61 din 12.06.2024

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **PERONOSPORA D.** (Mana);
BOTRYTIS A. (Putrgaiul cenușiu)

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **CEAPA ȘI USTUROI**



PERONOSPORA D. (Mana cepei), boala se manifestă pe frunze și tulpinile florifere. Pe acestea apar pete galbene, în dreptul cărora se observă un puf cenușiu – violaceu. Frunzele și tulpinile se înmoaie și cad la pământ unde putrezesc. În caz de atac puternic, sunt afectați și bulbii de ceapa, care stagnează din creștere.



BOTRYTIS A. (Putrgaiul cenușiu al cepei), boala se manifestă pe plantele tinere și mai ales pe bulbi. La plantele tinere, pe frunze se observă pete albicioase, circulare sau ovale. În condiții de umiditate ridicată, pe frunzele atacate, în dreptul țesuturilor necrozate se formează un puf cenușiu. Atacul cel mai frecvent se manifestă pe bulbi, la care se constată o înmuiere a țesuturilor, începând din zona coletului.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr.1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos cu:

1. **ZOXIS 250 SC / NORIOS 250 SC – 0,08 % sau**
2. **BANJO 500 SC / CARTALA 0,04 % sau**
3. **ORTIVA TOP – 0,1% sau**
4. **ALCUPRAL 50 PU – 0,5 % sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu insecticide pentru combaterea daunătorilor:

DELIA / HYLEMIA A. (Musca cepei);
THRIPS T. (Tripsul tutunului);
SUILLIA L. (Musca usturoiului);
THRIPS T. (Tripsul tabaci)



HYLEMIA A. (musca

cepei), specie cu doua generatii de adulti pe an. Adultul are corpul cenusiu –galbui cu pete si dungi caracteristice, pronot galbui, aripi galbene, picioare negre. larvele sunt alb galbui, cele din prima generatie ataca frunzele si bulbii in formare, iar cele din a doua generatie numai bulbii. In interiorul unui bulb de ceapa se dezvoltă larvele care produc galerii profunde, atacul fiind insotit de degradarea tesuturilor pe care se instaleaza diferite ciuperci. Bulbii atacati isi pierd fermitatea si au un miros caracteristic neplacut. Frunzele se ingalbenesc, se vestejesc si se usuca. Larvele din prima generatie produc cele mai mari pagube, atunci cand plantele sunt tinere.



THRIPS T. (Tripsul tutunului), ataca frecvent in anii caldurosi si

secetos. Atacul se manifesta pe parcursul lunilor iunie-iulie, plantele se opresc din crestere, frunzele sunt lipsite de turgescenta, iar cultura are o culoare argintie.

1. **LASER 240 SC / NEXUBA - 0,04% sau**
2. **BENEVIA - 0,75 l/ha. sau**
3. **MOSPILAN 20 SP/GAZELLE – 0,025 % sau**
4. **KARATE ZEON / NINJA - 0,02 % sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA PRIMIREA AVERIZARII.**

Alte recomandari:

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant, si se va repeta la 8 zile, in functie de remanenta produsului folosit si conditiile meteo.

Pentru aderenta solutiei pe plante, in aceasta se va adauga ARACET AGRICOL 0,15 – 0,2%.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.62 din 12.06.2024

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **GRAPHOLITA MOLESTA** (Molia orientala a fructelor) – **GEN. A II-a și alți daunatori** (Molia vargata, afide, etc.)

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **CAIS, PIERSIC**



GRAPHOLITA M. (Molia orientala a fructelor), larva acestui daunator ataca lastarii și fructele de piersic. Larvele patrund în lastari printre frunzele mici din varf sau pe la baza pedicelului primelor frunze laterale, unde forează galerii. Lastarii atacați se ofilesc, se îndoaie, apoi toată porțiunea atacată se usuca. În fructe, larvele patrund pe la peduncul, unde formează galerii înguste spre sambure, continuând să se hranească cu pulpa fructului din jurul samburelui pe care o degradează.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 1**, pentru **gen. a II-a**. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz cu:

1. **DELTAGRI /FASTER DELTA** – 0,03 % sau
2. **KARATE ZEON / NINJA-0,015 %** sau
3. **CORAGEN** - 0,0175 % sau
4. **MAVRIK 2F /EVURE** – 0,05 % sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor:

MONILINIA FR. (Monilioza); **TAPHRINA D.** (Basicarea);
SPHAEROTHECA P. (Fainarea); **STIGMINA C.** (Ciuruirea)



MONILINIA FR. (Monilioza), atacul se manifestă pe flori, lastari, frunze, ramuri și fructe. Pot fi infectate toate elementele inflorescentelor. Petalele și frunzele tinere din buchetele florale se ofilesc, se înmoaie, se brunifică și se usuca. Florile și frunzele brunificate și uscate rămân pe pom în tot cursul perioadei de vegetație. Lastarii tineri atacați se brunifică, se usuca și se îndoaie cu varful în jos. Cel mai frecvent este atacul pe fructe, acestea putând fi infectate în orice stadiu al

dezvoltarii lor. Cele foarte tinere(la inceputul formarii lor) se brunifica si se usuca.Cu timpul, ele se desprind de pe ramuri si cad.Mult mai des boala apare pe fructele ce se gasesc intr-un stadiu mai avansat de dezvoltare sau care se apropie de maturitate.



TAPHRINA D. (BASICAREA), se manifesta pe frunze, fructe si ramuri. Frunzele atacate prezinta pe anumite portiuni sau pe toata suprafata, hipertrofii ale parenchimului foliar, ceea ce determina aspectul basicat al lor, cu umflaturi pe fata superioara si adancituri pe cea inferioara. Aceste frunze se inrolesc la inceput, apoi devin galbene si in final brune. In cazul unui atac puternic, frunzele se desprind si cad, iar pomii raman desfrunziti de timpuriu. Lastarii atacati se ingroasa si raman scurti. Fructele atacate prezinta portiuni hipertrofiate, basicate, brune in dreptul carora tesuturile crapa. La piersicii atacati, se observa si o scurgere de clei.



SPHAEROTHECA P. (Fainarea), boala se manifesta pe frunze si lastarii tineri. Pe ambele fete ale frunzelor apar pete albicioase, de forme diferite. Frunzele se incretesc si se rasucesc, raman mici, se usuca si cad de timpuriu. Cresterea lastarilor tineri este inhibata, lastarii raman scurti, se indoaie la varf si se usuca. Pe fructe, apar pete albicioase, care ulterior se brunifica, raman mici, se deformeaza si crapa.

1. PROLECTUS – 0,8 – 1,2 kg./ha sau
2. SCORE 250 EC / MAVITA250 EC - 0,02% sau
3. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,5 % sau
4. SULPHUR 80 WG – 3,0 kg./ ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant si se va repeta la interval de 7 – 10 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile meteo.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 63 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **PHYTOPHTHORA I.** (Mana); **SEPTORIA L.** (Septorioza); **ALTERNARIA SP.** (Alternarioza); **BOTRITYS C.** (Putregaiul cenușiu)
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **TOMATE, ARDEI, VINETE – în câmp**



PHYTOPHTHORA I. (Mana), atacul se manifestă pe frunze, tulpini și fructe. Pe frunze apar pete galbui situate la varful foliolelor. Datorită necrozei țesuturilor, petele foliare devin brune – negricioase și sunt înconjurate de o bordură galbuie. Pe fața inferioară a frunzelor, în dreptul petelor, pe vreme umedă se observă un puf albicios format din sporangiofori. Pe tulpini apar pete brune, izolate sau confluențe. Pe fructe apar pete brune violacee, mai mari sau mai mici, care se formează în dreptul pedunculului și apoi cuprind întregul fruct.



SEPTORIA L. (Septorioza), boala se manifestă pe frunze și tulpini, pe care apar pete (de 2 – 3mm) aproape circulare, de culoare bruna – cenușie, delimitată de o margine mai închisă. După o perioadă petele devin albicioase și prezintă pe suprafața lor numeroase puncte negre. Țesuturile se necrozează, iar frunzele afectate se usucă, începând cu cele bazale. Atacul pe tulpina se manifestă prin apariția unor pete cenușii, adâncite în țesuturi, care au pe suprafața lor pete brune – negricioase.



ALTERNARIA SP. (*Alternarioza*), boala se manifesta pe

toate organele plantei. Pe frunze apar pete izolate, circulare, de culoare bruna. Cand numarul petelor se mareste, acestea conflueaza, iar frunzele se usuca. Pe tulpini, petioluri si pedunculi apar pete ovoidale concentrice, brun – negricioase. Pe fructe infectiile se manifesta prin pete mici, de forma circulara, adancite, mai frecvnt in zona pedunculului.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 4**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz cu:

1. **ORTIVA TOP** - 0,1% sau
2. **MERPAN 80 WDG/FLO-CAPTAN** - 0,15 % sau
3. **CAPTAN 80 WDG / CAPTADIN** - 0,15 % sau
4. **CURENOX 50** - 0,15 -0,2 % sau
5. **CUPROFIX ULTRA/NOVICURE** -0,16- 0,24 % sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se poate complexa cu insecticide pentru combaterea daunatorilor:

MACROSYPHON E. (Paduchele verde al solanaceelor);

LEPTINOTARSA D. (Gandacul din colorado)



MACROSYPHON E. (*paduchele verde al solanaceelor*), ataca

preferential tomatele si vinetele. Formeaza colonii aglomerate pe partea inferioara a frunzelor si dispersate pe inflorescente. In camp atacul cu o densitate numerica mai mare are loc in lunile mai – iunie si august – septembrie. Daunatorul ataca in stadiul de larva si adult. Afecteaza plantele prin intepare, de unde absorb hrana din tesuturi.



LEPTINOTARSA D. (*Gandacul din colorado*), prezinta doua generatii pe

an. Ataca in stadiul de adult si larva vinetele si tomatele, afectand toate organele aeriene ale plantei. In momentul aparitiei larvelor atacul este prezent in cultura de vinete si tomate pe toata perioada de vegetatie.

1. **MAVRIK 2F /EVURE** – 0,05 % sau
2. **SIVANTO PRIME 200 SL** - 0,056 % sau
3. **DELTA GRI / FASTER DELTA** – 0,0 5 % sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA PRIMIREA AVERTIZARII.**

ATENTIE!!

Intotdeauna cititi si utilizati produsele de protectie a plantelor – conform recomandarilor de pe eticheta, respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare!

Alte recomandari:

Tratamentul se va repeta la interval de 7–12 zile in functie de remanenta produsului folosit.

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Nationala Fitosanitara

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 64 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **PSEUDOPERONOSPORA C.** (Mana);
PSEUDOMONAS L. (Patarea unghiulara); **SPHEROTHECA F.** (Fainarea).
Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **CASTRAVETI, DOVLECEI, DOVLECI, PEPENI.**



PSEUDOPERONOSPORA C. (*mana castravetilor*), atacul se manifesta la castraveti. Boala se manifesta numai pe frunze, indiferent de faza fenologica in care se afla plantele. Pe fata superioara a frunzelor atacate, apar pete colturoase, de culoare galbuie, delimitate de nervuri. Ulterior, petele foliare devin brune. In dreptul petelor de boala, pe fata inferioara a frunzelor, se formeaza un puf cenuziu- violaceu, format din sporangi. In conditii favorabile, petele foliare se extind. Ele cuprind intreaga suprafata a limbului.



PSEUDOMONAS L. (*Patarea unghiulara*), pe frunze apar pete colturoase, de culoare verde inchis. In conditii favorabile petele conflueaza, iar in dreptul acestora, pe partea inferioara a frunzelor, apare un exsudat bacterian mucilaginos. Ulterior tesuturile din dreptul petelor se usuca, se desprind si cad, iar frunzele apar ciuruite.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr.3**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz, cu:

1. **MERPAN 80 WDG -/FLO- CAPTAN – 0,15 % sau**
2. **INFINITO 687,5 SC - 0,14 % sau**
3. **CHAMP 77 WG /COPPERMAX – 0,2% sau**
4. **SULPHUR 80 WG – 0,3 % sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se poate complexa cu insecticide pentru combaterea daunatorilor: **TRIALEURODES V.** (Musculita alba de sera); **CEROSIPHA G.** (Paduchele verde al castravetilor); **THRIPS T.** (Tripsi); **TETRANYCHUS URTICAE** (Acarianul rosu comun).



TRIALEURODES V. (musculita alba de sera), adultul are culoarea galbuie, de 1,2- 1,6 mm lungime, corpul impreuna cu aripile, picioarele si antenele sunt acoperite de o secretie pulverulenta de un alb imaculat, ochi rubinii. Atacul poate fi intalnit in culturile de tomate, vinete si ardei in sere si solarii. Atacul musculitei albe are loc pe partea inferioara a frunzelor, de unde adultii si larvele absorb continutul celular prin intepare. Atac insotit pe partea superioara a aparatului foliar de secretii zaharate.



CEROSIPHA G. (Paduchele verde al castravetilor), daunator specific culturilor de bostanoase, vector de viroze transmise la cucurbitacee. Formeaza colonii aglomerate pe partea inferioara a frunzelor si dispersate pe flori. Frunzele se gofreaza si se strang in glomerul, plantele se opresc din crestere. La inceput atacul apare izolat, ca ulterior sa se raspandeasca in toata cultura.



THRIPS T. (Tripsul tutunului), ataca culturile de cucurbitacee, se locali localizeaza pe partea inferioara a frunzelor, unde larvele si adultii distrug tesuturile pana in vecinatatea epidermei externe. Dupa atac frunzele se necrozeaza zonal, nervurile ramanand intacte, iar restul tesuturilor normal colorate.

1. **MOSPILAN 20 SP / GAZELLE** – 0,0125% sau
2. **JUVINAL 10 EC** - 0,05 % sau
3. **POLECI/DECA 2,5 EC**- 0,03- 0,05 % sau
4. **NISSORUN 10 WP** – 0,04 % (Castraveti)
- 0,08 % (Dovlecei, Dovleci, Pepeni) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA PRIMIREA AVERTIZARII**

ATENTIE!!

Intotdeauna cititi si utilizati produsele de protectie a plantelor – conform recomandarilor de pe eticheta, respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare!

Alte recomandari:

Tratamentul se va repeta la interval de 7–12 zile in functie de remanenta produsului folosit.

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Nationala Fitosanitara

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 65 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **COMPLEX DAUNATORI (BRUCHOPHAGUS R.; TYCHUS F. ; CONTARINIA M. ; CONTARINA MEDICAGINIS)**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **LUCERNA DE SAMANTA**



BRUCHOPHAGUS R. (*Viespea semintelor de lucerna*),adultii apar la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie.Dupa o perioada scurta de hranire incepe pontă. Ouale sunt depuse in semintele de lucerna de abia in formare. Larvele aparute se hranesc cu continutul semintelor distrugand semintele de lucerna incepand cu faza de lapte si terminand cu cea de coacere cand apar adultii.Transformarea in nimfa se face in interiorul semintei. Noii adulti parasesc samanta si dau a doua generatie.

TYCHIUS F.(*Gargarita lucernei*) , insecta are o singura generatie pe an. Adultii ataca numai frunzele tinere. Larvele apar esalonat, incepand de la mijlocul lunii iunie si pana in luna august. Larvele produc cele mai mari pagube, rozand un orificiu in peretele pastaii, hranindu-se cu seminte cand acestea sunt inca verzi.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului , numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **PRAGUL ECONOMIC DE DAUNARE: >10 % plante atacate.**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsul de mai jos:

1. **KARATE ZEON / NINJA - 0,15 l/ha. sau**
2. **DELTA GRI / FASTER DELTA – 0,3 l / ha. sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA SFARSITUL INFLORITULUI**

Alte recomandări:

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant, si se va repeta la interval de 6–8 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile meteo.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de

bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Națională Fitosanitară Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 66 din 12.06. 2024

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **VANASSA CARDUI** (Omidă scaietilor); **APHIS FABAE** (afide)

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **SOIA ; FLOAREA - SOARELUI**



VANASSA CARDUI (*Omidă scaietilor*) -Adultii sunt fluturi mari colorati acestia au anvergura aripilor de 5 cm. si au 3-4 cm latime.Zonele laterale ale aripilor din fata sunt portocalii cu desene albe si negre.Aripile din spate au desene in culorile roz,maro masliniu,alb,negru.



Larvele- sunt omizi care ajung la peste 2,5- 4 cm.lungime,inainte de inupare au culoarea neagra si numerosi spini de culoare neagra si galbena, iar pe fiecare parte au o dunga de culoare galbena.Acestea se hranesc cu cuticula frunzelor (prefera partea inferioara) lasand doar nervurile neatinse.Utilizand frunza atacata larva tase un adapost (cuib) de matase, protejata de aceasta.

Pupele- sunt de culoare maronie sau gri,acestea sunt agatate de frunze si atarna cu capul in jos,avnd formeii literei „J”

Ouale- au forma unui butoi cu dungi orizontale, sunt depuse de catre femele,solitar, pe partea superioara a frunzelor. Ouale sunt de culoare verde-deschis iar inainte de eclozare devin gri.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsul de mai jos:

1. BACTOSPEINE DF - 0,6- 1,0 kg/ha sau

2. DECIS EXPERT 100EC – 75 ml /ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate,peptu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Tratamentul se va repeta la interval de 6-8 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile climatice.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si

completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Conform prevederilor legale prevazute in: Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr. 4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015.

Respectarea cerintelor SMR 7 – SMR 8 Fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (p.p.p) au urmatoarele obligatii:

Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate in Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST EXPERT.

Sa utilizeze produse de protectie a plantelor numai in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare dupa eticheta produsului;

Sa pastreze pe o perioada de 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate si utilizate in exploatare ,precum si Registrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare cu produse de protectie a plantelor.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării/f enofa za culturi i	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesati: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

