

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 69 din 24.06. 2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de :

TOMATE, ARDEI, VINETE – spatii protejate (sere, solarii).

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **TUTA ABSOLUTA (Molia minera a tomatelor); MACROSYPHON E. (paduchele solanaceelor); TRIALEURODES V. (musculita alba de sera ;TRETANNYCUS URTICAE (Paianjanul rosu).**

TUTA ABSOLUTA(molia minera a tomatelor),adultii sunt nocturni iar ziua stau ascunsi printre frunzele plantelor gazda. Au lungimea de 5-6 mm si anvergura aripilor de 8-10mm, de culoare gri-maronie, cu antene filiforme, aripile anterioare prezinta puncte negre.

Larvele, prezinta culoarea crem, cu capul negru iar pe parcursul cresterii, aceasta capata culoarea roz sau verde inchis. Aceasta molie isi incepe activitatea timpuriu si poate fi observata in solarii atata timp cat temperaturile sunt peste 9 C. Primele atacuri se pot observa sub forma galeriilor din frunze sau asupra varfurilor de crestere, florilor si fructe, prin prezenta excrementelor negre ale larvelor.

MACROSYPHON E. (paduchele solanaceelor), adultul are culoarea verde deschis, de 3,0-3,6 mm, picioare zvelte, antene mai lungi decat corpul. Ataca preferential tomatele si vinetele, unde formeaza colonii aglomerate pe partea inferioara a frunzelor si dispersate pe inflorescente si flori. Acest daunator afecteaza plantele prin intepare, de unde absoarbe hrana din tesuturi.

TRIALEURODES V. (musculita alba de sera), adultul are culoarea galbuie, de 1,2- 1,6 mm lungime, corpul impreuna cu aripile, picioarele si antenele sunt acoperite de o secretie pulverulenta de un alb imaculat, ochi rubinii. Atacul poate fi intalnit in culturile de tomate, vinete si ardei in sere si solarii. Atacul musculitei albe are loc pe partea inferioara a frunzelor, de unde adultii si larvele absorb continutul celular prin intepare. Pe partea superioara a aparatului foliar apar secretii zaharate.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE (peste 10-15% plante atacate).**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. SIVANTO PRIME 200 SL - | 0,056% sau |
| 2. AFFIRM | - 0,15 % sau |
| 3. POLECI | - 0,03- 0,05 % sau |
| 4. FLIPPER | - 1,6 % sau |
| 5. MINECTO ALPHA | - 0,1- 0,125 % sau |
| 6. NISSORUN 10 WP | - 0,1 % tomate |
| - | 0,1 % vinete |
| - | 0,4 % ardei sau |

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: PHYTOPHTHORA INFESTANS. (mana); PHYTOPHTHORA PARASITICA (putrezirea radacinii, tulpinii si fructelor); CLADOSPORIUM FULVU (patarea cafei a frunzelor); BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu); SEPTORIA LYCOPERSICI (patarea alba a frunzelor); ALTERNARIA SOLANI (patarea brună a frunzelor).

CLADOSPORIUM FULVU (patarea cafei) Este o boala specifica spatiilor protejate (sere si solarii), unde plantele atacate pot ajunge chiar si la 75-100%. Aparitia bolii este favorizata de temperaturi ridicate completate de o umiditate foarte ridicata de 95 %, nebulozitate persistenta, lipsa aerisirii, la care se adauga si prezenta picaturilor de apa pe plante. Atacul incepe pe frunzele plantelor dezvoltate. Semnele bolii apar pe fata frunzei sub forma de pete galbene, aceste pete au corespondent pe spatele frunzei cu un puf alb in prima zi apoi cafeiniu si in cele din urma brun – violaceu. Frunzele se usuca de timpuriu incepand cu cele bazale se necrozeaza si mor. Boala afecteaza recolta si calitatea fructelor.

BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenușiu). Atacul se manifesta pe toate organele supraterrane, primele simptome apar pe frunzele de la baza tulpinei. Pe frunzele batrane apar pete verzui sau galbui – verzui, care se necrozeaza si uneori prezinta o zonare concentrica. La suprafata tesuturilor atacate intr-o faza mai avansata a bolii apare un puf abundent de culoare cenușie. Acesta reprezinta partea asexuata a ciupercii respectiv conidioforii cu conidii. Conidioforii purtati de curentii de aer infecteaza celelalte organe ale plantelor (tulpini, frunze). Pe tulpini atacul se manifesta cel mai frecvent la baza plantelor, prin aparitia unor pete adancite in tesut care daca patrund in tulpina de jur- imprejur determina moartea plantelor. Pe fruct se manifesta sub forma unui putregai umed si moale la locul de insertie al pedunculului, la suprafata caruia se dezvolta din abundenta puful de conidiofori si conidii de culoare cenușie. Fructele atacate se desprind si cad pe sol.

1. ORONDIS ULTRA – 0,04 % sau

2. CALIZI/SINORO - 0,08% sau

3. CARIAL STAR - 0,06% sau

4. SCALA - 0,2 % sau

5. KOCIDE 2000 - 0,2 % sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

ATENTIE!!

Intotdeauna cititi si utilizati produsele de protectie a plantelor – conform recomandarilor de pe eticheta, respectati cu strictete timpul de pauza pana la recoltare!

Alte recomandari:

Masuri preventive pentru Tuta absoluta:

Eliminarea si distrugerea plantelor cu simptome de atac;

Eliminarea buruienilor gazda pentru molia miniera atat in cultura cat si in zona apropiata;

Respectarea asolamentului si evitarea monoculturii;

Utilizarea capcanelor feromonale – atra TUT-S (sera).

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor si familiilor de albine în conformitate cu :Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 70 din 24.06.2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de :
CARTOFI

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **LEPTINOTARSA DECEMLINEATA** (gandacul din colorado) **GEN. a II -a**

Leptinotarsa De.(gandacul din colorado) *adultii si larvele rod frunzele de la exterior spre interior,lasand intacte nervurile si lujerii plantelor.Dezvoltarea larvelor din generatia a doua dureaza 21 de zile.Adultii din a doua generatie isi fac aparitia la inceputul lunii august si se intalnesc pe culturile tarzii de cartof, pana in octombrie- noiembrie,cand se retrag pentru hibernare.*

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 3**. La generatia **a II-a** avertizarea reprezinta tratamentul **nr. 1** si se efectueaza numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:**DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE - 5 % plante atacate.** Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos,dupa caz :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. CORAGEN/VOLIAM | - 50 ml/ha sau |
| 2. LASER 240 SC | - 0,1 l/ ha. sau |
| 3. MOSPILAN 20SG / KRIMA -20 SG | - 0,1 kg./ha sau |
| 4. MOSPILAN 20 SP /GAZELLE | - 0,06 kg./ha sau |
| 5. MAVRIK 2F /EVURE | - 0,2 l/ha sau |

alte produse pentru protectia plantelor omologate,peu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor:**PHYTOPHTORA INFESTANS (Mana cartofului); ALTERNARIA SOLANI (Alternarioza).**

PHYTOPHTHORA IN.(mana cartofului),*parazitul ataca frunzele,tulpinile si tuberculi.*
Pe frunze boala se manifesta la inceput sub forma unor pete verzui – galbui,cu marginea difuza. Petele apar de obicei la marginea foliolelor. In scurt timp petele se maresc,devin brune,apoi brun –negricioase.Pe fata inferioara a frunzei, se observa pe vreme umeda un puf albicios, frunzele atacate se inegresc, se usuca si cad, lastarii ramanand desfrunziti.Pe tulpina atacul se prezinta sub forma unor pete alungite, de culoare bruna – negricioasa, determinand innegrirea si uscarea acestor organe.Tuberculi atacati prezinta pete brune,brune – cenusiisau albastrii, care ocupa numai o parte din suprafata tuberculului.

ALTERNARIA SOL. (alternarioza),*atacul se manifesta pe frunze si pe tuberculi.Pe frunze,apar pete brune circulare usor vizibile,pe suprafata petelor se observa un puf, brun – inchis.Boala apare mai intai pe frunzele de la baza plantei apoi treptat pe cele mijlocii si superioare.Pe tuberculi, atacul se manifesta prin pete circulare de culoare bruna – negricioasa de aceeasi marime ca si cele de pe frunze.Pulpa in dreptul petelor putrezeste si capata o culoare neagra.*

- 1. CARIAR STAR - 0,6 l/ha sau**
- 2. CUPROFIX ULTRA -1,6 – 2,4 kg./ha sau**
- 3. ALCUPRAL 50 PU - 3,0 kg./ha. sau**
- 4. AMISTAR / MIRADOR 250 SC - 0,5 -1,0 l/ha sau**
- 5. CHAMP 77 WG – 2,0 kg /ha sau.**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: LA APARITIA LARVELOR DE - V 3

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu :Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr.71 din 24.06.2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la specia: **PRUN**
Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:**CYDIA FUNEBRANA** (viermele prunului)
– **GEN. a II- a; HYALOPTERUS PRUNI** (paduchele cenușiu)

CYDIA F. (viermele prunului), fluturii din generatia a doua, evolueaza la inceputul lunii iulie si pana la sfarsitul lunii august. La cateva zile de la aparitie are loc copulatia fluturilor,iar femelele depun pontele pe fructele ajunse la completa dezvoltare. Depunerea masiva a pontelor are loc in a doua jumătate a lunii iulie sau inceputul lunii august. Larvele aparute rod galerii in fructele aflate in faza de coacere. Spre sfarsitul lunii august sau inceputul lunii septembrie larvele ajung la completa dezvoltare si se retrag pentru iernare.

HYALOPTERUS P.(pduchele cenușiu al prunului), adultii si larvele se localizeaza si formeaza colonii pe fata inferioara a frunzelor si pe lastarii tineri, intepand si sugand sucular celular. Frunzele atacate se deformeaza, se incretesc, lastarii stagneaza in crestere, se deformeaza. Uneori se formeaza buchete de lastari scurt- nodati si frunze incretite.Organele atacate sunt inundate de roua de miere eliminata de insecte, pe care se instaleaza fumagina care, la randul sau,impiedica asimilatia frunzelor.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului:**nr.1** pentru generatia **aII-a**.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz,cu:

1. **DELTA GRI / FASTER DELTA** - 0,025% - 0,03% (0,250-0,3 l/ha.) sau
2. **KARATE ZEON / NINJA** -0,015 % (0,15 l/ha.) sau
3. **LASER 240 SC** – 0,06 % (0,6 l/ha)sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor:

POLISTIGMA RUBRUM (patarea rosie a frunzelor);**STIGMINA CARPOPHYLLA** (ciuruirea frunzelor); **MONILINIA SP.** (monilioza).

POLISTIGMA R. (patarea rosie a frunzelor),boala se manifesta incepand din luna mai , prin pete circulare, la inceput galbene,apoi portocalii, in final rosii.In dreptul petelor tesuturile se ingroasa, devin crustoase, usor bombate spre fata superioara, cu aspect ceros. Petele pot fi izolate sau confluyente, frunzele afectate se usuca si planta se defoliaza devreme. Fructele plantelor atacate sunt mici , de calitate slaba, cu cantitate redusa de zahar.

STIGMINA C.(ciuruirea frunzelor),atacul se manifesta pe frunze, fructe, ramuri. Pe frunze, atacul este cel mai fregvent, sub forma de pete circulare, brun – galbui, cu marginea rosietica, in dreptul carora tesuturile se necrozeaza, se desprind si cad, determinand ciuruirea frunzelor. Pe fructe atacul incepe din momentul in care acestea au diametrul de 2 cm pana la intrarea in parga. Petele de pe fructe sunt mici rosii, dispersate neuniform. Cand petele sunt foarte

numeroase, tesuturile fructului se brunifica, se intareste si crapa. Pe ramuri apar primavara pete amplasate in jurul mugurilor. Tesuturile petelor se necrozeaza incepand de la centrul. La atac puternic se produce craparea si exfolierea scoartei ramurilor. Florile atacate se ofilesc inainte de a se deschide.

MONILINIA SP. (monilioza), atacul se manifesta pe lastari, frunze, ramuri si fructe. Lastarii tineri atacati se brunifica, se usuca si se indoaie cu varful in jos. Cel mai frgent este atacul pe fructe, acestea putand fi infectate in orice stadiu al dezvoltarii lor. Cele foarte tinere (la inceputul formarii lor) se brunifica si se usuca. Cu timpul, ele se desprind de pe ramuri si cad. Mult mai des boala apare pe fructele ce se gasesc intr-un stadiu mai avansat de dezvoltare sau care se apropie de maturitate.

1. SYLLIT 400 SC – 0,13% (1,3 l/ha.) sau

2. CHORUS 50 - 0,045 - 0,075 % (0,45- 0,75 kg./ha.) sau

3. LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,05% (0,5 l/ha.) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **La depasirea PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE DE 10 % pomi atacati.**

Alte recomandări;

Tratamentul se va repeta la interval de 6-8 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile climatice nefavorabile.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 72 din 24.06. 2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de:
MAR, PAR

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **CYDIA POMONELLA** (viermele merelor) – **Gen. a II-a; APHIS POMI** (paduchele verde al marului).

CYDIA P. (viermele marului), adultii din a II- a generatie apar la sfarsitul lunii iunie. Fluturii generatiei a II-a depun oualele direct pe fructe, mai rar pe frunze. Larvele patrund in fructe obisnuit pe partea laterala unde de regula se gaseste o frunza sau un fruct lipit. Atacul se produce in doua forme: atacul primar, cand fructele sunt roase numai superficial, sub forma de galerii si atacul secundar, cand fructele sunt perforate in profunzime, fiind traversate de galerii pline de excavatii si de resturi brunificate. La completa dezvoltare, larvele parasesc fructele, migreaza pe tulpina si sub ritidomul acesteia, unde se transforma in pupe.

APHIS P. (paduchele verde al marului), insectele adulte formeaza colonii compacte pe dosul frunzelor si pe varful lastarilor. Inteapa frunzele si se hranesc cu suc celular. In urma intepaturilor, frunzele se rasucesc, se ingalbenesc si cad prematur. Pe dejectiile eliminate din abundenta pe frunze ("roua de miere") se instaleaza fumagina, care impiedica asimilatia normala a frunzelor.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr.1** pentru **gen. a II-a**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE.**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz, cu:

- 1. KARATE ZEON / NINJA** - 0,015% (0,225 l/ha.) sau
- 2. VANTEX 60 CS / NEXIDE 60 CS** – 0,009% (135 mL/ha.) sau
- 3. LASER 240 SC/ NEXUBA** – 0,06 % (0,9 l/ha) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se poate complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **VENTURIA I.** (rapanul); **PODOSPHAERA L.** (fainarea); **MONILINIA SP.** (monilioza).

VENTURIA I. (rapanul), ciuperca ataca toate organele tinere ale plantei (frunze, ramuri, fructe). Atacul pe frunze se manifesta prin pete mici, cenușii, care se extind treptat. Mai tarziu, petele foliare prezinta o culoare bruna- maslinie. Pe fructe apar pete cenușii- maslinii, in dreptul carora tesuturile se suberifica si crapa.

PODOSPHAERA L. (fainarea), atacul se manifesta pe frunze, lastari tineri. Frunzele tinere atacate sunt deformate, casante si se rasucesc cu marginile in sus. Frunzele afectate se usuca de timpuriu. Atacul pe fructele tinere produce o stagnare in crestere sau chiar caderea acestora.

MONILINIA SPP. (monilioza), boala se manifesta pe ramurile tinere si fructe. Infectia poate ajunge pe ramuri, pe care uneori apar gome. Pe ramuri se observa o uscarea, incepand de la varf si pana la insertia cu pedunculii uscati. Frunzele se vestejesc, luand aspectul unui buchet uscat. Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare, iar

pedunculul se acopera cu o masa abundenta de conidii. Fructele infectate se inmoaie, se incretesc, iar pulpa putrezeste si devine granuloasa.

1. **LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,05% (0,75 l/ha.) sau**
2. **INTEREST 25 EC/ DIFENZONE 25 EC – 0,0133 % (0,2 l/ha.) sau**
3. **CHORUS 50 - 0,03 - 0,05% (0,45 – 0,75 kg./ ha) sau**
4. **SWITCH 62,5 WG - 0,053 - 0,066 % (0,8-1,0 kg./ha). sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: 27.06 - 03.07. 2025

ATENTIE!

Pentru p.p.p. **VANTEX 60 CS / NEXIDE 60 CS**, certificatul de omologare se retrage la data de 31.03.2025, iar pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda din momentul retragerii omologarii o perioada de gratie de 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 30.09.2025), la care se adauga o perioada de gratie de 6 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri de produs la utilizatori (pana la data de 31.03.2026).

Alte recomandari:

Tratamentul se va repeta la interval de 7 – 10 zile in functie de remanenta produsului folosit si de conditiile climatice nefavorabile!

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, precum si Ordinul nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Toti utilizatorii profesionisti au obligatia de a completa la zi tratamentele fitosanitare conform modelului mai jos atasat si sa pastreze pentru o perioada de cel putin trei ani evidenta produselor fitosanitare care sunt utilizate la nivelul fermei.

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omologata /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg./ l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

