



Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 83 din 02.11. 2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **AGRIOLIMAX AGRESTE (Limax cenusiu)**
Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **RAPITA**



Scurtă descriere a dăunătorilor: **AGRIOLIMAX AGRESTE (Limaxul cenusiu)** Este un daunator nocturn dar ataca si ziua pe timp ploios si cald. Ataca numeroase plante, localizandu-se pe frunze la care distruge tesuturile dintre nervuri. Atacul este agresiv in vetre cu aspect de pasunat. Frunzele atacate au perforatii si marimi diferite, cu dare albicioase, lucitoare, transparente, pergamentoase indicii dupa care poate fi depistat atacul si in lipsa daunatorului.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

AXCELA - 7,0 kg. / ha. sau

META GOLD 3% (ARION PRO 3 G –a doua denumire comerciala) - 7,0 kg./ha. sau

META GOLD 5% - 4,0 kg./ha. sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: Pragul economic de daunare **1 -2 limacsi /mp.**

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al

Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE


Nr. 84 din 02.11.2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **APHIS SPP. (AFIDE); MUSTELE CEREALELOR (OSCINELLA FRIT (musca suedeza a cerealelor); OSCINELLA PUSILLA (musca suedeza a orzului); PHORBIA SECURIS (musca cerealelor)**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **CEREALELE PAIOASE**



Afidele ataca culturile de cereale paioase (grau, orz, triticele) inca din toamna si reapar o data cu perioadele calduroase din primavara. Acestea conducand la: stagnarea cresterii si dezvoltarii plantelor (debilitarea plantelor), moartea plantelor (la atacuri masive). Daunele asupra culturilor pot fi atat directe prin colonizare masiva si hranire cat si indirecte intrucat afidele pot fi vectorii pentru transmiterea bolilor. Adultii si larvele afidelor se hranesc cu ajutorul aparatului bucal adaptat pentru intepat si supt. Prin hranire cu suc celular al plantelor acestea provoaca daune majore culturilor de cereale paioase.



Larvele si pupele hiberneaza in interiorul cerealelor de toamna sau in graminee salbatice. Puple se gasesc atat pe resturile vegetale, cat si in sol. Larvele mustei ataca plantele tinere care se afla in faza de 2-3 frunzulite ale culturii, aceasta perioada este optima pentru depunerea oualor. O data larva aflata in interiorul mugurelui terminal, nu mai poate fi combatuta.

1. **CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC – a doua denumire comerciala) – 0,1 l / ha sau**
2. **MAVRIK 2 F (EVURE – a doua denumire comerciala) 0,2 l / ha sau**
3. **KAISO SORBIE 5 EG (REXARIS – a doua denumire comerciala) – 0,15 kg. / ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: Pragul economic de daunare 6 larve la 100 de tulpini.

Alte recomandari:

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDA



Autoritatea Nationala Fitosanitara

Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 85 din 02.11. 2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **BACTERII SI CIUPERCI FITOPATOGENE (focul bacterian al rozaceelor, rapan, fainare, monilioze, patare rosie, ciuruire)**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI.**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian)** *Pe perioada de iarna, bacteriile rezista bine in zonele marginale ale ulcerelor formate in sezonul anterior pe ramuri si trunchi, indeosebi la par, mai putin la mar. De asemenea bacteriile supravietuiesc in muguri, fructe bolnave si ramuri. Primavara, bacteriile devin active, se inmultesc, atacul se manifesta pe toate organele supraterrane ale plantei. Arsura inflorescentelor este primul simptom si apare primavara devreme. Florile se ofilesc, se brunifica si se inegresc. Ele cad sau raman atasate de pom. Pe frunze, atacul se manifesta sub forma unor pete brune, care se extind si ocupa intregul limb foliar. Lastarii atacati au frunze moarte si persistente. Fructele bolnave se inegresc la par si se brunifica la mar.*

VENTURIA INAEQUALIS (Rapanul) Toamna la caderea totala a frunzelor trebuie, aplicate masuri de igiena culturala, de curatire si indepartare a ramurilor bolnave, de curatirea muschilor, lichenilor de pe suprafata trunchiurilor si a ramurilor. Primavara ciuperca ataca toate organele tinere ale plantei (frunze, flori, ramuri, fructe). Atacul pe frunze se manifesta prin pete mici, cenușii, care se extind treptat. Mai tarziu, petele foliare prezinta o culoare bruna- maslinie. Atacul pe flori este asemanator cu cel descris pe frunze. Pe fructe apar pete cenușii- maslinii, in dreptul carora tesuturile se suberifica si crapa.

PODOSPERA LEUCOTRICA (Fainarea) Ciuperca ierneaza sub forma de miceliu de rezistenta in mugurii vegetativi si florali. Primavara atacul se manifesta pe frunze, flori, lastari tineri. Frunzele tinere atacate sunt deformate, casante si se rasucesc cu marginile in sus. Frunzele afectate se usuca de timpuriu. Florile de mar atacate au sepalele deformate, ele raman sterile. Atacul pe fructele tinere produce o stagnare in crestere sau chiar caderea acestora.

cu:

1. **ALCUPRAL 50 PU** - 0,2 - 0,3 % sau
2. **CUPROFIX ULTRA** - 0,4 % sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA CADEREA TOTALA A FRUNZELOR.**

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin

pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

Conform prevederilor legale prevazute in:Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor,fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării/f enofa za cultur ii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentulu i, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul / buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea conditiilor de depozitare,manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatatiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesati: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

